



Foto: Sabrina Juárez

Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas DICIEMBRE 2020

EL OBSERVATORIO

El observatorio de la Base Orcadas es el más antiguo que ha estado operando en la Antártida desde su creación en 1903. En este Observatorio se miden ininterrumpidamente parámetros geomagnéticos que muestran la evolución y el comportamiento de una región situada cerca del polo magnético y lejos de las perturbaciones antropogénicas. Al principio, la instrumentación utilizada en el Observatorio Orcadas era analógica. Desde 2012, se ha instalado el sistema INDIGO (Observatorio Geomagnético Digital de Intermagnet) para actualizar y digitalizar las mediciones. En el 2013, el Observatorio fue aceptado como miembro de INTERMAGNET (Red Magnética Internacional en Tiempo Real).

Autores: María Inés Gil, Silvana Ricci, Jesús González, Sabrina Juárez, M. Laura Cariaga.

Coord. Área Geofísica: Geof. Camila Farías
cfarias@smn.gov.ar

Información sobre Copyright

Este reporte ha sido producido por empleados del Servicio Meteorológico Nacional con el fin de documentar sus actividades de investigación y desarrollo. El presente trabajo ha tenido cierto nivel de revisión por otros miembros de la institución, pero ninguno de los resultados o juicios expresados aquí presuponen un aval implícito o explícito del Servicio Meteorológico Nacional.

La información aquí presentada puede ser reproducida a condición que la fuente sea adecuadamente citada.

UBICACIÓN

El Observatorio Magnético de la Base Orcadas se localiza en la Isla Laurie, de las Islas Orcadas de Sur en la Antártida Argentina. Presenta las siguientes características:

- Coordenadas Geográficas: 60° 44' 15'' S 44° 44' 14'' O
- Altura sobre el nivel del mar: 5 m.



Figura 1: Ubicación de la Base Orcadas

CONCEPTOS TEÓRICOS

El **campo magnético** terrestre se parece al campo de una larga barra magnética o al de una esfera uniformemente magnetizada.




Figura 2: Representación gráfica del campo magnético terrestre

El campo o las líneas de flujo, siguen la trayectoria que muestra la Figura 2. Nótese que la dirección del campo es vertical en los polos magnéticos, y horizontal en el ecuador magnético. El entendimiento de esta geometría es importante para la interpretación de las anomalías magnéticas.

La intensidad del campo, es una función de la cantidad de líneas por unidad de área. La intensidad en la región polar es aproximadamente el doble que en la ecuatorial, oscilando entre 60.000 y 30.000 gammas o nanoteslas (nT).

Es importante tener en cuenta que el campo magnético varía tanto en espacio como en tiempo.

Instrumentos del Observatorio

El Observatorio cuenta con un magnetómetro protónico que registra la intensidad del campo, F , un magnetómetro triaxial fluxgate para registrar la componente horizontal H , vertical Z , y la declinación D , y un teodolito que permite determinar D e I por medio de una observación. En la Figura 3 se presenta un esquema de las componentes del campo magnético enunciadas en este apartado.




Figura 3: Componentes del campo magnético

DESCRIPCIÓN SISTEMA INDIGO

Este sistema proporciona el hardware y el software para operar un Observatorio Magnético Digital básico.

El hardware consiste en un magnetómetro triaxial fluxgate, un magnetómetro protónico, un Digitizador, un receptor GPS para proporcionar un tiempo exacto, un registrador de memoria USB y una fuente de alimentación DC alimentada por batería. El software **IndigoWatch** captura los datos del magnetómetro digitalizado, registra en el disco y realiza el análisis de datos básicos.

OBSERVATORIO MAGNÉTICO OPERATIVO

El Observatorio opera con Geomagnetic Data Acquisition System (GDAS), el mismo fue desarrollado por la British Geological Survey (BGS). El IndigoWatch registra las variaciones de las componentes del campo magnético, pero no los valores absolutos. El operador supervisa estas variaciones.

Las observaciones absolutas conjuntamente con los datos obtenidos por el Sistema Índigo, se procesan en el software GDAS, y producen un registro continuo de los **valores absolutos del campo magnético**.

INTERMAGNET

INTERMAGNET es una red mundial de Observatorios Magnéticos que operan casi en tiempo real. El objetivo de INTERMAGNET es establecer una red global de Observatorios Magnéticos digitales que cooperen, adoptando modernas especificaciones estándar para equipos de medición y registro, con el fin de facilitar el intercambio de datos y la elaboración de productos geomagnéticos en tiempo real.

En 2013 el Observatorio Magnético Orcadas fue aceptado como miembro de INTERMAGNET y las mediciones magnéticas generadas con el Sistema INDIGO son reportadas diariamente a Edimburgo GIN.

La información se puede visualizar en <http://www.intermagnet.org/data-donnee/dataplot-eng.php>

RED INTERMAGNET

A continuación se presentan las componentes del campo magnético para todo el mes de diciembre presentadas a la red INTERMAGNET.





Figura 4a: Componentes del campo magnético del 1 al 10 de diciembre. En rojo se ve la componente horizontal (H) y en azul la vertical (Z), ambas en nT. En verde se presenta la declinación del campo magnético (D) en minutos y en negro la intensidad del campo magnético en nT





Figura 4b Componentes del campo magnético del 11 al 20 de diciembre. En rojo se ve la componente horizontal (H) y en azul la vertical (Z), ambas en nT. En verde se presenta la declinación del campo magnético (D) en minutos y en negro la intensidad del campo magnético en nT.





Figura 4c: Componentes del campo magnético del 21 al 31 de diciembre. En rojo se ve la componente horizontal (H) y en azul la vertical (Z), ambas en nT. En verde se presenta la declinación del campo magnético (D) en minutos y en negro la intensidad del campo magnético en nT.

OBSERVACIONES ABSOLUTAS

A continuación (Figuras 5, 6 y 7) se presenta la evolución temporal durante todo el mes de diciembre de la declinación, la inclinación y la intensidad total del campo magnético a partir de las observaciones absolutas realizadas a las 10 y 18 UTC.




Figura 5: Declinación magnética en función del tiempo




Figura 6: Inclínación magnética en función del tiempo





Figura 7: Intensidad total del campo magnético en función del tiempo

ECLIPSE SOLAR

El día 14 de diciembre se produjo un eclipse de sol. En este observatorio, donde fue parcial (alrededor de un 35%) se realizaron además de las observaciones absolutas habituales, observaciones en el horario de inicio del eclipse (12:45 HOA), momento máximo (13:46 HOA) y su fin (14:45 HOA).

Cabe aclarar que este plan de trabajo, se realizó el día anterior al evento, domingo 13 y miércoles 16 con el objetivo de recopilar datos durante eventos destacados como éste y contar con los mismos horarios de datos para poder compararlos con los días anteriores y posteriores al mismo. La información obtenida será analizada en forma conjunta con el Observatorio de Pilar, Cipolletti y el registro obtenido en la Base Antártica Científica Carlini, por parte del personal que participa en la Campaña Antártica de Verano (CAV). Dicho análisis será compartido en una publicación específica al tema.



Eclipse solar en Base Orcadas. Foto: Guardaparque Diego Ferrer (DNA)



Parte del personal de la CAV en Base Carlini. Realizando trabajos de medición y registro de datos.

COMENTARIOS FINALES

El día 07 la mancha solar AR2790 desató una llamarada solar de clase C7 y lanzó una CME hacia la Tierra. El 10 de diciembre, en las primeras horas del día, una CME golpeó el campo magnético de la Tierra elevando repentinamente la velocidad del viento solar a casi 600 km /s, las perturbaciones son claramente observables en cada una de las componentes del campo en el registro diario aunque el impacto no ha provocado una tormenta geomagnética.

El día 21, el viento solar proveniente de un agujero coronal en la atmosfera solar, produjo intervalos activos, mientras que el día 22 una corriente de viento solar de alta velocidad golpeó el campo magnético de la Tierra, se observan condiciones de inestabilidad en ambos registros diarios, a lo igual que el día 24 y 25. Las perturbaciones y amplitudes visualizadas en los registros diarios del 28 y 29 responden a una corriente de viento solar dirigida hacia la Tierra.

Las condiciones del viento solar (velocidad, densidad de protones, temperatura) durante el mes de diciembre pueden verse en el siguiente link:

<https://www.ngdc.noaa.gov/dscovr/portal/index.html#/vis/summary/1m/1564628400000>

Para mayor información sobre lo abordado, consultar el apartado de conceptos teóricos en:

<https://www.smn.gob.ar/informes-climaticos>

<http://repositorio.smn.gob.ar/>

